ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1-АНТИПИРИЛ-4-АРОИЛ-5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-1*H*-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНОВ С 1,3-ДИФЕНИЛГУАНИДИНОМ

© 2024 г. В. А. Лядов^а, Н. В. Шаврина^а, Е. С. Денисламова^а, *, А. Н. Масливец^б

^а ФГАОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
Россия, 614990 Пермь, Комсомольский просп., 29

^б ФГБОУ «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
Россия, 614068 Пермь, ул. Букирева, 15
*e-mail: katherin85@rambler.ru

Поступила в редакцию 10.08.2023 г.

После доработки 16.08.2023 г.

Принята к публикации 18.08.2023 г.

1-Антипиррил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1*H*-пиррол-2,3-дионы реагируют с 1,3-дифенилгуанидином с образованием 6-антипиррил-9-ароил-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дионов, структура которых подтверждена методами ЯМР ¹H и ИК-спектроскопии.

Ключевые слова: 1*H*-пиррол-2,3-дионы, нуклеофильные превращения, дифенилгуанидин

DOI: 10.31857/S0514749224040143, **EDN:** RXTQIF

ВВЕДЕНИЕ

Потребность человечества в новых лекарственных препаратах неуклонно растет с каждым днем. Синтез новых гетероциклических соединений для исследования их биологической активности является одним из перспективных направлений современной органической химии. Представляют интерес соединения, содержащие фармакофорные фрагменты. Так, например, в структуре 1-антипиррил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1*H*-пиррол-2,3-дионов **2a–e** содержится антипиррильный фрагмент, который обуславливает противовоспалительные свойства анальгина и аминафеназона [1].

Соединения **2a–e** являются моноциклическими 1*H*-пиррол-2,3-дионами, обладающими высокой реакционной способностью по отношению к бинуклеофильным реагентам (енаминам, производным мочевины и тиомочевины, *o*-фенилендиамину) [2]. Взаимодействие 1-арил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1*H*-пирро-

л-2,3-дионов с 1,3-дифенилгуанидином приводит к образованию спиробисгетероциклических систем спиро[пиррол-2,4'-имидазола] [3].

В настоящей работе изучено взаимодействие 1,3-дифенилгуанидина с ранее полученными 1-антипиррил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1*H*-пиррол-2,3-дионами [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Соединения **1a–e** кипятили в безводном толуоле в течение 20–30 мин до появления интенсивной бордовой окраски с образованием 1-антипиррил-4-ароил-5-метоксикарбонил-1*H*-пиррол-2,3-дионов **2a–e** с последующей отгонкой растворителя и хлороводорода. В полученный раствор прибавляли в эквимольном количестве 1,3-дифенилгуанидин, предварительно растворенный в толуоле. Полученную реакционную смесь продолжали кипятить в течение 10–15 мин до исчезновения ярко-бордовой окраски и образования бесцветных кристал-

лов 6-антипирил-9-ароил-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дионов **3a–e** (схема).

По-видимому, соединения **3a–e** образуются вследствие нуклеофильной атаки вторичной группы NH реагента на наиболее электродефицитный углерод (C⁵) пирролдионного цикла с последующим замыканием имидазольного цикла в результате внутримолекулярной атаки второй вторичной аминогруппой 1,3-дифенилгуанидина сложноэфирной карбонильной группы и отщеплением метанола, подобные превращения были рассмотрены ранее [4].

Соединения **3a–e** – бесцветные кристаллические вещества, легко растворимые в ДМФА, ДМСО, ацетоне, ацетонитриле, труднорастворимые в хлороформе, толуоле, метаноле, этилацетате, нерастворимые в воде и алканах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Структура синтезированных соединений доказана с применением современных методов: спектроскопии ИК, ЯМР ¹H в растворителе ДМСО-*d*₆. Химические сдвиги в спектрах ЯМР ¹H приведены в миллионных долях (м.д.). Температура плавления измерена на приборе OptiMelt MPA100 (США). Спектры ЯМР ¹H записывали на спектрометре Bruker Avance III HD400 [400 МГц] (Швейцария) в ДМСО-*d*₆, внутренний стандарт – ГМДС. Элементный анализ выполняли на анализаторе vario Micro cube (Германия). Индивидуальность синтезированных соединений подтверждали методом ТСХ на пластинах Sorbfil (элюент: бензол–этилацетат, 5 : 1), проявляли парами иода, УФ излучением 254 нм. ИК спектры регистрировали на ИК Фурье спектрометре Nicolet 380 FT-IR (США) в таблетках КВг.

Исходные 1-антипиррил-4-ароил-3-гидрокси-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-оны **1a–e** синтезированы из соответствующих енаминов и оксалилхлорида по ранее описанной методике [4].

6-Антипиррил-9-бензоил-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дион (3a). Навеску 1-антипиррил-4-бензоил-3-гидрокси-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-она (**1a**) массой 0.223 г (0.5 ммоль) растворяли в 40 мл толуола и кипятили до появления интенсивно-бордовой окраски с последующей отгонкой растворителя и хлороводорода. В полученный раствор прибавляли 0.106 г (0.5 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина, который предварительно растворяли в 10 мл толуола. Кипятили в течение 10–15 мин, при охлаждении выпадал светло-желтый осадок, который перекристаллизовывали в метаноле. Выход 0.159 г (51%), т.пл. 234–235°C (разл., метанол). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3053–3069 ш (ОН, NH), 1780 (C⁴O), 1735 (C⁷O), 1619 (СО ароил). Спектр ЯМР ¹H (ДМСО-*d*₆), δ , м.д.: 2.16 с (3H, Me–C), 3.21 с (3H, Me–N), 7.21–7.96 гр.с (20H, 4Ph), 9.08, 9.42 уш.с (ОН, NH). Найдено, %: С 69.75; Н 4.75; N 13.61. C₃₆H₂₈N₆O₅. Вычислено, %: С 69.22; Н 4.52; N 13.45.

6-Антипиррил-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-9-(4-хлорбензоил)-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дион (3b). Синтезирован аналогично соединению **3a** из 0.239 г (0.5 ммоль) 1-антипиррил-3-гидрокси-4-(4-хлорбензоил)-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-она (**1b**) и 0.106 г (0.5 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина. Выход 0.161 г (49%), т.пл. 232–233°C (разл., метанол). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3050–3070 ш (ОН, NH), 1780 (C⁴O), 1730 (C⁷O), 1611 (СО ароил). Спектр ЯМР ¹H (ДМСО-*d*₆), δ , м.д.: 2.16 с (3H, Me–C), 3.20 с (3H, Me–N), 7.07–7.96 гр.с (19H, 3Ph+C₆H₄), 9.04, 9.31 уш.с (ОН, NH). Найдено, %: С 65.34; Н 4.16; N 12.77. C₃₆H₂₇ClN₆O₅. Вычислено, %: С 65.60; Н 4.13; N 12.75.

6-Антипиррил-9-(4-бромбензоил)-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дион (3c). Синтезирован аналогично соединению **3a** из 0.262 г (0.5 ммоль) 1-антипиррил-4-(4-бромбензоил)-3-гидрокси-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-она **1c** и 0.106 г (0.5 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина. Выход 0.172 г

(49%), т.пл. 238–239°C (разл., метанол). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3049–3078 уш (ОН, NH), 1781 (C⁷O), 1732 (C⁴O), 1630 (СО ароил). Спектр ЯМР ¹H (ДМСО-*d*₆), δ , м.д.: 2.17 с (3H, Me–C), 3.21 с (3H, Me–N), 7.06–7.80 гр.с (19H, 3Ph+C₆H₄), 9.03, 9.30 уш.с (ОН, NH). Найдено, %: С 61.43; Н 3.89; N 11.92. C₃₆H₂₇BrN₆O₅. Вычислено, %: С 61.46; Н 3.87; N 11.95.

6-Антипиррил-8-гидрокси-2-имино-9-(4-метилбензоил)-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дион (3d). Синтезирован аналогично соединению **3a** из 0.232 г (0.5 ммоль) 1-антипиррил-3-гидрокси-4-(4-метилбензоил)-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-она (**1d**) и 0.106 г (0.5 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина. Выход 0.165 г (52%), т.пл. 233–234°C (разл., метанол). ИК спектр, ν , см⁻¹: 3053–3071 уш (ОН, NH), 1782 (C⁷O), 1733 (C⁴O), 1613 (СО ароил). Спектр ЯМР ¹H (ДМСО-*d*₆), δ , м.д.: 2.17 с (3H, Me–C), 2.40 с (3H, Me–C₆H₄), 3.21 с (3H, Me–N), 7.11–7.74 гр.с (19H, 3Ph+C₆H₄), 8.96, 9.23 уш.с (ОН, NH). Найдено, %: С 69.53; Н 4.96; N 13.38. C₃₇H₃₀N₆O₅. Вычислено, %: С 69.58; Н 4.73; N 13.16.

6-Антипиррил-8-гидрокси-2-имино-9-(4-метоксибензоил)-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дион (3e). Синтезирован аналогично соединению **3a** из 0.230 г (0.5 ммоль) 1-антипиррил-3-гидрокси-4-(4-метоксибензоил)-5-метоксикарбонил-5-хлор-1*H*-пиррол-2-она (**1e**) и 0.106 г (0.5 ммоль) 1,3-дифенилгуанидина. Выход 0.167 г (51%), т.пл. 236–237°C. ИК спектр, ν , см⁻¹: 3050–3070 уш (ОН, NH), 178 (C⁷O), 1730 (C⁴O), 1611 (СО ароил). Спектр ЯМР ¹H (ДМСО-*d*₆), δ , м.д.: 2.16 с (3H, Me–C), 3.20 с (3H, Me–N), 3.86 с (3H, MeO–C₆H₄), 7.11–7.74 гр.с (19H, 3Ph+C₆H₄), 9.02, 9.44 уш.с (ОН, NH). Найдено, %: С 67.45; Н 4.74; N 12.88. C₃₇H₃₀N₆O₆. Вычислено, %: С 67.88; Н 4.62; N 12.84.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан удобный метод синтеза 6-антипиррил-9-ароил-8-гидрокси-2-имино-1,3-дифенил-1,3,6-триазаспиро[4.4]нон-8-ен-4,7-дионов **3a–e**. Введение антипиррильного заместителя в положение 1 пирролдионового цикла исходных 1*H*-пиррол-2,3-дионов вместо арильного не изменяет направления реакции и приводит к образо-

ванию спирибисгетероциклической системы спи-ро[пиррол-2,4'-имидазола].

ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (проект № FSNF-2023–0004).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Лядов Вадим Александрович, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-7267-7577>

Шаврина Ника Валерьевна, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0002-1702-2332>

Денисламова Екатерина Сергеевна, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0003-1220-3625>

Масливец Андрей Николаевич, ORCID:
<https://orcid.org/0000-0001-7148-4450>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Машковский М. Д. *Лекарственные средства*. М.: Новая волна. **2012**, 164–166.
2. Масливец А. Н., Машевская И. В. *2,3-Дигидро-2,3-пирролдионы*. Пермь: Пермский госуниверситет, **2005**.
3. Бубнов Н. В., Денисламова Е. С., Алиев З. Г., Масливец А. Н. *ЖОрХ*. **2011**, *47*, 526–528. [Bubnov N. V., Denislamova E. S., Aliev Z. G., Maslivets A. N. *Russ. J. Org. Chem.* **2011**, *47*, 523–526.] doi 10.1134/S1070428011040099
4. Денисламова Е. С., Лядов В. А., Макрушин Д. Е., Рябов В. Г., Дмитриев М. В., Масливец А. Н. *ЖОрХ*. **2023**, *59*, 535–540. [Denislamova E. S., Lyadov V. A., Makrushin D. E., Ryabov V. G., Dmitriev M. V., Maslivets A. N. *Russ. J. Org. Chem.* **2023**, *59*, 647–651.] doi 10.31857/S0514749223040122

Reaction of 1-Antipyryl-4-aroil-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-diones with 1,3-Diphenylguanidine

V. A. Lyadov^a, N. V. Shavrina^a, E. S. Denislamova^a, *, and A. N. Maslivets^b

^a Perm National Research Polytechnic University,
prosp. Komsomolskii, 29, Perm, 614990 Russia

^b Perm State University, street Bukireva, 15, Perm, 614068 Russia
*e-mail: katherin85@rambler.ru

Received August 10, 2023; revised August 16, 2023; accepted August 18, 2023

1-Antipyryl-4-aroil-5-methoxycarbonyl-1H-pyrrole-2,3-diones react with 1,3-diphenylguanidine to form 6-antipyryl-9-aroil-8-hydroxy-2-imino-1,3-diphenyl-1,3,6-triazaspiro[4.4]non-8-en-4,7-diones, the structure of which was confirmed by ¹H NMR and IR spectroscopy.

Keywords: 1H-pyrrole-2,3-diones, nucleophilic transformations, diphenylguanidine